

Aktuellt om vaccinationer

Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm



Aktuellt om vaccinationer

- Vaccinationskampanjen 2026/27
- Pneumokockvaccination
- Meningokockvaccination vid splenektomi, aspleni, hypospleni
- Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund



Vaccinationskampanjen

Vaccinationskampanjen

- Vaccinationskampanjen mot **säsongsinfluensa och covid-19** startar den **2 november 2026**
- **Pågår till 31 december 2026**, men med begränsad aktivitet fram till **31 mars 2027** vid fortsatt smittspridning
- Datum för start för personalvaccinationer meddelas senare
- **Samma målgrupper som förra året**
- I år inget webinarium – utan en webbsida



[Information om vaccinationskampanjen | Vårdgivarguiden](#)

[Start](#) > [Administration](#) > [Verksamhetsadministration](#) > [Bedriva vaccinationsverksamhet](#) > [Om vaccinationskampanjen](#)

Information om vaccinationskampanjen

Mer information kommer

Observera att vaccin inte ska beställas förrän uppdaterad information om vacciner och beställningsrutiner finns publicerad på sidan. Mer information kommer innan oktober.

Här finns information för vaccinatorer som deltar i vaccinationskampanjen mot influensa och covid-19. Du hittar aktuella rekommendationer, praktiska rutiner och stöd för planering, bokning, genomförande och uppföljning av vaccination.

Epidemiologi – förra årets säsong

Trots initial oro kring en snabb spridning av en ny undergrupp av influensa A(H3N2) (subklad K) under hösten 2025 blev säsongen 2025/2026 en relativt vanlig influensasäsong med nästan 3000 personer som behövde inläggande vård med influensa i Region Stockholm. Toppen av smittspridningen sågs kring jul. Det var däremot den hittills mildaste säsongen för covid-19, med två mindre toppar under början av hösten. Ändå sjukhusvårdades 1500 personer i regionen med covid-19.

Då influensa även kommande säsong förväntas leda till en större sjukdomsbörda än covid-19 är vaccinationskampanjen 2026/27 förklarad i tid för att ge optimalt skydd

Hitta på sidan

Information om vaccinationskampanjen

[Epidemiologi – förra årets säsong](#)

[Rekommenderade grupper](#)

[Tidsplan för kampanj](#)

[Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning](#)

[Oral antikoagulantia](#)

[Vaccination vid allergi](#)

[Flera vaccin vid samma tillfälle](#)

[Bokning Alltid öppet](#)

[Vaccin som används under kampanjen 2026/27](#)

[Beställning och distribution av vaccin](#)

[Vaccinera](#)

[1177 hitta vård](#)

[Kommunikation och informationsmaterial](#)

Kortfattad information om de ämnen som brukar tas upp på webinariet

Med länkar till fördjupad information

Förklaring

Ja – Rekommenderas

Nej – Undvik

(-) – Ja, om indikation finns

MHR = mycket hög risk

Grupp \ Vaccin	Årtlig Influenta-vaccination	Årtlig Vaccination mot Covid-19	Pneumokock-vaccination – se schema för tidpunkt och preparat
Ålder	Ja, 65+	Ja, 75+	Ja, 65+
Kronisk sjukdom - kronisk hjärt-/ kärlsjukdom - kronisk lungsjukdom - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation - kronisk leversvikt - diabetes mellitus	Ja, från 6 månaders ålder	Ja, 50+	Ja, från 2 års ålder
Downs syndrom	Ja, från 6 månaders ålder	Ja, 18+	Ja, från 2 års ålder
Kronisk njursjukdom	Ja, från 6 månaders ålder	Ja, 18+	Ja, från 2 års ålder (MHR)
Nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering) till exempel immunbristsjukdom, nylig stamcellstransplantation, organtransplantation, immunhämmande behandling vid cancer eller autoimmun sjukdom.	Ja, från 6 månaders ålder	Ja, 18+	Ja, från 2 års ålder (MHR)
Cystisk fibros eller cochleaimplantat	-	-	Ja, från 2 års ålder (MHR)
Likvortläckage	-	-	Ja, från 2 års ålder (MHR)
Splenektomerad, aspleni, hypospleni	Ja, från 6 månaders ålder	-	Ja, från 2 års ålder (MHR)
Gravid	Ja	-	Nej
Daglig omsorg (SÄBO och hemtjänst)	-	Ja, 65+	-
Nedsatt hälsotillstånd	Ja	Ja, 18+	-

Tabell

Stöd till vaccinatörer
för bedömning av vaccinationsindikation utifrån ålder och riskgruppstillhörighet.

Pneumokockvaccination


Rekommendationer för pneumokockvaccination

- Vuxna och barn från 2 års ålder

Riskgrupp: Ökad risk

- Personer från det år de fyller 65 år
- Vuxna och barn från 2 års ålder med vissa kroniska sjukdomar;
 - kronisk hjärtsjukdom
 - kronisk lungsjukdom (till exempel KOL eller svår astma)
 - diabetes mellitus
 - kronisk leversvikt
 - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft som extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen


Tidigare vaccinationsstatus:




Riskgrupp: Mycket hög risk

- Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel efter organtransplantation, cytostatikabehandling eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat).
- Kronisk njursjukdom (CKD stadium 4-5) inkl. nefrotiskt syndrom
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros

Tidigare vaccinationsstatus:



Tidigare vaccinationsstatus:




- Aspleni eller hypospleni
- Likvorläckage

Version: 2026-09-09


Pneumokockvaccination

- Över 100 serotyper av pneumokocker




Pneumokockvaccination

- Över 100 serotyper av pneumokocker




Pneumokockvaccination

- Över 100 serotyper av pneumokocker



Pneumokockvaccination

- Över 100 serotyper av pneumokocker




Rekommendationer för pneumokockvaccination

- Vuxna och barn från 2 års ålder

Riskgrupp: Ökad risk

- Personer från det år de fyller 65 år
- Vuxna och barn från 2 års ålder med vissa kroniska sjukdomar;
 - kronisk hjärtsjukdom
 - kronisk lungsjukdom (till exempel KOL eller svår astma)
 - diabetes mellitus
 - kronisk leversvikt
 - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft som extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen


Tidigare vaccinationsstatus:



Riskgrupp: Mycket hög risk


- Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel efter organtransplantation, cytostatikabehandling eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat).
- Kronisk njursjukdom (CKD stadium 4-5) inkl. nefrotiskt syndrom
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros

Tidigare vaccinationsstatus:



- Aspleni eller hypospleni
- Likvorläckage

Tidigare vaccinationsstatus:



Version: 2026-09-09

TAKE HOME MESSAGE om pneumokocker

- Det är mycket på gång.
- Håll koll på Vårdgivarguiden: [Pneumokocker – Vaccinering av riskgrupper | Vårdgivarguiden](#)

Meningokockvaccination


Meningokockvaccination

vid splenektomi, aspleni, hypospleni

- Kostnadsfrihet startade 15 september 2026.
- Ersättning via Vaccinera.
- Aktuell specialistklinik ansvarar för grundvaccination i samband med en **planerad splenektomi**. Remiss till vårdcentral för påfyllnadsdoser.
- Efter **akut splenektomi** ska aktuell kirurgklinik remittera patienten till vårdcentral för grundvaccination och påfyllnadsdoser.
- **Övriga splenektomerade** patienter, till exempel efter splenektomi utomlands eller i annan region, som är i behov av vaccination vaccineras av vårdcentral där patienten är listad.
- Aktuell specialistklinik ansvarar för alla vaccinationer vid **aspleni/hypospleni**. Om patienten inte är anknuten till en specialistklinik kan vaccinationerna ges kostnadsfritt på vårdcentral.

Meningokockvaccination

vid splenektomi, aspleni, hypospleni




MPR-vaccination

Mässlingsvaccination

- Påskyndat införande av kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund den 1 september
- Utförs av Vårdval vaccinationsmottagningar
- Till vuxna som bedöms ha otillräckligt skydd mot mässling
- Bokning via Alltid Öppet med triagering
- Framöver frivilligt erbjudande för Vårdcentraler att vaccinera





Tid för frågor