


Säsongsvirus och höstens vaccinationskampanj och Nya pneumokockrekommendationer


Katarina Widgren
Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm
Ordförande, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Webbinarium för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga – 18 feb 2026


Influenza, covid-19 och RSV




Influenza




covid-19



RSV




INFLUENZA




65 år eller äldre

COVID-19




75 år eller äldre

Vaccinationstäckning



Olika typer av pneumokockvaccin



PPV – Polysackaridvaccin

T-cellsberoende immunsvär, dvs inget immunologiskt minne
 Kan ges från 2 års ålder
~~Fler serotyper~~

PPV23, Pneumovax®

PCV – Konjugatvaccin

T-cellsberoende immunsvär, dvs inducerar immunologiskt minne
 Mer robust skydd
 Kan ges från 6 veckors ålder

PCV10, Synflorix® PCV20, Prevenar20®
 PPV13, Prevenar 13® PCV21, Capvaxive®
 PPV15, Vaxneuvance® ...



Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

PUBLICERAD: 25 JANUARI 2019 • UPPDATERAD: 9 JANUARI 2026 • ARTIKELNUMMER: 26009 •
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN


Rekommendationer om pneumokockvaccination

- Vuxna och barn från 2 års ålder

Riskgrupp: Ökad risk

- Personer från det år de fyller 65 år
- Vuxna och barn från 2 års ålder med vissa kroniska sjukdomar;
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom (till exempel KOL eller svår astma)
- diabetes mellitus
- kronisk lever- eller njursvikt
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft som extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen


Tidigare vaccinationsstatus



Riskgrupp: Mycket hög risk

- Aspleni* eller hypospleni*
- Nedsatt immunförsvar* på grund av sjukdom eller behandling, till exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat).
- Likvortläckage*
- Nefrotiskt syndrom
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros

Tidigare vaccinationsstatus



* En dos PPV23 (Pneumovax) ges minst 2 månader efter PCV20. Revaccination med PPV23 vart femte år. Detta gäller personer med aspleni, hypospleni och likvortläckage samt efter en individuell bedömning av personer med gravt nedsatt immunförsvar.

Individuell bedömning

av behovet av tillägg
med Pneumovax.

Gravt nedsatt immunförsvar



Riktlinje för vaccination vid immunsuppressiv behandling från Infektionsläkarföreningens vaccingrupp

Rekommendation för pneumokockvaccination vid monoterapi	Läkemedel
Vaccination rekommenderas vanligen inte Dock sedvanlig bedömning av underliggande sjukdomar/ålder PPV20	· Steroider lågdos ^A · Azatioprin · Metotrexat · JAK hämmare · Anti-IL-1 · Natalizumab · Vedolizumab · Cyklosporin
PPV23 rekommenderas men kan avstås till unga som är friska förutom grundsjukdomen Vid ytterligare riskfaktorer: PCV20 + PPV23	· Anti-IL-6 · TNF hämmare
PCV20 + PPV23	· Steroider högdos ^A · Rituximab (Anti-CD20) ^B

[Riktlinje för vaccination vid immunsuppressiv behandling - Infektion.net](https://infektion.net)